

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

12.01.2021

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
ФлавоДроп 8%

(Организация-разработчик: «Евроббиофарм ГмбХ»,  
Постштрассе 25, 20354, Гамбург, Германия)

Номер регистрационного удостоверения: 276-3-9.13-1382№ПВИ-3-10.7/02311

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: ФлавоДроп 8% (FlavoDrop8%).

Международное непатентованное наименование: флавофосфолипол.

2. Лекарственная форма: микрогранулированный порошок для орального применения

ФлавоДроп 8% содержит в 1 г в качестве действующего вещества: флавофосфолипол – 80 мг, а также вспомогательные вещества: крахмал – 100 мг, соевую муку – 240 мг, кукурузную муку – 70 мг, декстрозу – 50 мг, бобовое масло – 3 мг и карбонат кальция – до 1 г.

ФлавоДроп 8% не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. По внешнему виду препарат представляет собой микрогранулированный порошок коричневого цвета со специфическим запахом.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства.

Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным по 25 кг в полиэтиленовых мешках, упакованных в полипропиленовые мешки.

5. ФлавоДроп 8% хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °С до 30 °С.

6. ФлавоДроп 8% следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. ФлавоДроп 8% относится к группе фосфогликолипидных антибиотиков.

10. Входящий в состав препарата флавофосфолипол является фосфогликолипидным антибиотиком с бактериостатической активностью против преимущественно грамположительных микроорганизмов желудочно-кишечного тракта, а также предотвращает развитие внехромосомной резистентности бактерий к антибактериальным лекарственным средствам.

Флавофосфолипол практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте и не накапливается в органах и тканях животных после перорального применения; выводится из организма в неизменном виде с фекалиями.

ФлавоДроп 8% в рекомендуемых дозах хорошо переносится животными, не обладает эмбриотоксическими, тератогенными и гепатотоксическими свойствами. ФлавоДроп 8% по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. ФлавоДроп 8% применяют пороссятам и свиньям на откорме, телятам и крупному рогатому скоту на откорме, сельскохозяйственной птице с лечебной целью при желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животных и птицы к компонентам препарата.

13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Все работы необходимо проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, респиратор). Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы следует тщательно вымыть с мылом лицо и руки, рот прополоскать водой.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ФлавоДропом 8%. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо тотчас смыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций и/или случайном проглатывании лекарственного препарата следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению лекарственного препарата или этикетку).

14. ФлавоДроп 8% разрешен к применению животным в период беременности и лактации у потомства с первых дней жизни.

15. ФлавоДроп 8% вводят в корма на комбикормовых заводах или кормцехах хозяйств, используя существующие технологии многоступенчатого смешивания.

Корм, содержащий препарат, готовят ежедневно, исходя из суточного потребления.

ФлавоДроп 8% применяют животным групповым способом в смеси с кормом в следующих дозах:

- поросятам	- 75-200 г/т корма;
- свиньям на откорме	- 37,5-60,5 г/т корма;
- курам-несушкам	- 37,5-60,5 г/т корма;
- бройлерам	- 37,5-60,5 г/т корма;
- индейкам	- 37,5-60,5 г/т корма;
- гусям, уткам	- 37,5-60,5 г/т корма;
- телятам	- 75-200 г/т корма;
- крупному рогатому скоту на откорме	- 37,5-200 г/т корма.

Препарат можно применять животным, в том числе птице, с первых дней жизни. Продолжительность курса применения не более 14 дней.

16. При применении ФлавоДропа 8% в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животных и птицы к компонентам препарата и появлении побочных явлений (отказ от корма, нарушение координации) его использование прекращают.

17. Симптомы передозировки при применении препарата не выявлены.

18. ФлавоДроп 8% совместим с любыми лекарственными средствами (сульфаниламидами, антибиотиками, ионофорными кокцидиостатиками) и кормовыми добавками.

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить в предусмотренных дозировках.

21. Убой животных на мясо и использование в пищевых целях продукции животноводства разрешается на следующий день после окончания применения ФлавоДропа 8%. Яйца птиц разрешается использовать в пищевых целях без ограничений.

Наименования и адреса  
производственных площадок  
производителя лекарственного препарата  
для ветеринарного применения.

«Shandong Shengli  
Bioengineering Corporation Limited»,  
South end Tongji Road, Hi-tech  
development Zone, Jining, Shandong  
Province 272073, Китай

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной держателем  
регистрационного удостоверения  
лекарственного препарата на принятие  
претензий от потребителя.

ООО «Торговый дом-ВИК»,  
Россия, 140050, Московская область,  
городской округ Люберцы, дачный  
поселок Красково, Егорьевское ш.,  
д.3А, оф.33

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата ФлавоДропа 8%, согласованная Россельхознадзором 13 мая 2013.